

Patientenname:			
SVNr.:		Untersuchungsdatum:	

Sehr geehrte Patientin! Sehr geehrter Patient!

GEBEN SIE BITTE DIE MÖGLICHKEIT ODER DAS BESTEHEN EINER SCHWANGERSCHAFT VOR UNTERSUCHUNGSBEGINN AM INFOPOINT BEKANNT!

Die Irrigoskopie (Röntgenuntersuchung des Dickdarms) dient zur Untersuchung des Dickdarms bei Verstopfung, Durchfällen, Stuhlnormmäßigkeiten, Entzündungen, Divertikeln, zur postoperativen Kontrolle und bei anderen Indikationen.

Vorbereitung zur Irrigoskopie / virtuellen Colonoskopie

Zwei Tage vor der Untersuchung (am _____) ist nur leichte Kost erlaubt.

Frühstück: Tee oder schwarzer Kaffee mit Zwieback

Mittags und Abends: klare Suppe (ohne Einlage), gekochtes Kalb- oder Rindfleisch, Geflügel, gekochter Fisch, Zwieback, weißer Reis, Teigwaren

Verboten sind: Fett, Obst, Gemüse, Milch- und Milchprodukte, Vollkornbrot oder –gebäck, Mehlspeisen.

Bitte mindestens 2 bis 3 l Flüssigkeit trinken (Wasser, Kräuter- oder Früchtetee)

Am Abend bitte **2 Tabletten Dulcolax** einnehmen.

Einen Tag vor der Untersuchung (am _____) Diät wie am Vortag beibehalten.

Um **17:00 Uhr X-Prep** einnehmen (*Beipacktext beachten!*). Der Einnahme sollte eine leichte, fettfreie Mahlzeit vorausgehen. Nach der Einnahme bitte nichts mehr essen, jedoch viel trinken (insgesamt 2-3 Liter).

Am Tag der Untersuchung (am _____)

Irrigoskopie:

Untersuchungstermin am Vormittag (bis 12 Uhr) → Tee oder schwarzer Kaffee mit Zwieback zum Frühstück sind erlaubt.

Untersuchungstermin am Nachmittag (ab 12 Uhr) → bitte während des Tages nüchtern bleiben, Tee oder schwarzer Kaffee mit Zwieback zum Frühstück und bis 2 Stunden vor der Untersuchung sind erlaubt.

Virtuelle Colonoskopie:

Bitte am Tag der Untersuchung nichts essen und nichts trinken!

Untersuchungsablauf Irrigoskopie

Die Irrigoskopie dauert im Normalfall ca. 20 Minuten und ist nicht schmerzhaft. Sie erhalten mittels eines Darmrohres, das nur wenige cm eingeführt wird, einen Kontrastmitteleinlauf. Das Kontrastmittel (KM) ist vorgewärmt, sodass Sie das Einlaufen des KMs (abgesehen von einem leichten Stuhldrang) nicht spüren werden. Wenn der Darm ausreichend dargestellt ist, wird das KM wieder abgelassen, was Sie ebenfalls nicht spüren werden. Um nun eine optimale Beurteilbarkeit des Dickdarms zu erreichen, wird mittels eines kleinen Ballons etwas Luft in den Darm verabreicht, was ein Blähungsgefühl verursacht. Der Arzt fertigt sodann Röntgenaufnahmen des Dickdarms an. Anschließend wird das Darmrohr entfernt und Sie können auf die Toilette gehen.

Das Kontrastmittel verursacht keine Nebenwirkungen und Sie können anschließend normal essen und trinken. Ihr Stuhl wird einige Tage eine weiße Färbung aufweisen. Dies ist das restliche KM, welches nun ausgeschieden wird.

Sind Sie schwanger?

JA NEIN

Hatten Sie in der letzten Woche eine Darmspiegelung?

JA NEIN

Wenn ja, wurde eine Gewebeprobe entnommen?

JA NEIN

Datum, Unterschrift Patient/In

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
(bei PatientInnen bis zum vollendeten 18. LJ)

Kürzel oder Unterschrift des Arztes

Kürzel oder Unterschrift MTF / RT

erstellt/geändert von:	M. Wölkart	geprüft von:	W. Hofer, C. Riedl
freigegeben von:	B. Siegl (QM, HP, XR)	am:	15.04.2017
Datei im QM:	PI-IRRIGO.pdf	Version:	4.0
		Datei XR:	XRPI-IRRIGO.dotx